

Chevillère Push med D4

Art: 222124 | Marque: **PUSH**



112,90 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

La Chevillère Push med soutient de manière prolongée l'articulation de la cheville et peut être utilisée dans toute une série de cas et de conditions. La chevillère est basée sur le concept du tape fonctionnel. Le niveau de pression ainsi que les limites de pronation/supination sont réglables. L'application de silicone garantit un bon maintien de la position. Des bandes de confort sont prévues autour des zones sensibles de la cheville, telles que le tendon d'Achille. La chevillère est confortable et facile à enfiler grâce au large cou-de-pied et à un heel-lock intégré. **Technologie Sympress™** Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La Chevillère Push med est facile à appliquer et peut être lavée sans précaution particulière. **INDICATIONS**

- Instabilité (résiduelle) modérée

- Traitement de lésions aiguës des ligaments latéraux de la cheville (alternative au bandage)
- Traitement des fractures stables de la cheville (Weber de type A)
- Traitement de suite des fractures de la cheville (y compris la fracture de Jones)
- Traitement postopératoire des blessures ou des déchirures des ligaments
- Prévention secondaire des lésions des ligaments de la cheville (en cas d'effort modéré avec accumulation de fluide)

- + Bonne alternative au tape.
- + Assure à la fois la compression et le soutien mécanique.
- + L'application de silicone à l'intérieur de l'orthèse assure un bon maintien de la position.
- + Efficace sans renfort rigide ce qui optimise son confort et prévient les frottements.
- + Englobe une partie de l'avant-pied pour un meilleur soutien de celui-ci.
- + Fonctionne aussi bien avec que sans chaussure.

- En raison de son volume, l'orthèse se porte de préférence dans une chaussure de sport à lacets.
- L'orthèse ne peut être utilisée que dans la phase subaiguë, lorsque la plupart des gonflements ont disparu.
- L'application de l'orthèse demande un peu de pratique.